単位について

- ・SI単位系とMKS単位
- ・"単位"について知識が無いと、 どんなことが起きるか?

例1. mm? m? m/s?

例2. kg/m²とmmが同じもの?


例3. 水圧とエネルギー

1

温度とは

分子運動の激しさを表現する数量 :分子運動の無い状態を"O"とする。






"フラックス"という概念

木と金属はどちらが冷たいか? (触る人の体温、木と金属が置かれている環境は同じ)

"フラックス"を電気回路で考える



$$F = g(C_s - C_a)$$
$$= \frac{C_s - C_a}{r}$$


2



気体の表現

・理想気体の状態方程式: PV = nRT Rとは何か? 式の意味を掴む。 P, V, Tの単位を考える。

5



湿度

- ・君は"水蒸気"を見たことがあるか?
- •色々な湿度:
 - (1)水蒸気圧(hPa)
 - (2)絶対湿度(kg/m³)
 - (3)比湿(kg/kg)
 - (4)相対湿度(%)
 - (5)飽差(kPa)

気温5℃の湿度90%はジメジメしてるのか?

6

乾燥空気の密度: $P_iV = n_iRT$ $P_d = P_1 + P_2$


$$\rho_i = \frac{\omega_i}{V} = \frac{P_i M_i}{RT} \qquad \rho_d = \frac{\omega_1 + \omega_2}{V}$$

では、湿潤空気の密度は? $P = P_d + e$


$$\rho = \frac{\omega_d + \omega_W}{V} = \frac{P_d M_d}{RT} + \frac{e M_W}{RT}$$

降水=全ての水文現象の源

降水は単なる量の問題ではない。 その時空間変動をどう捉えるか?





降水のメカニズム (地学 啓林館) 3 維対安定 高 度 凝結高度 -空気塊が飽和して水蒸 気が凝結 ☆ 空気塊の温度 高 湿剤所熱減率 にしたがって 温度が降下 になり、雨 を降らせる。 乾燥断熱減率 乾燥断熟滅率 風下側山麓 高温で乾燥した空気塊




降水空間変動;流域平均降水量

基本: $P = \frac{1}{A} \iint_A p(x, y) dx dy$








$$P = \frac{1}{A} \sum_{i=1}^{I} a_i \, \hat{p}_i$$

13

降水空間変動



Radar observations of the June 27, 1995, storm in the Rapidan River basin, central Virginia. NEXRAD tracked the center of the storm (a). Total rainfall accumulations (mm) were calculated based on the time series of radar images (b). This intense storm produced an average of 344 mm (13.5 inches) over the catchment and caused extensive flooding throughout the basin. Source: Smith, Baeck, et al. (1996).

(Hornberger et al, 1998. "Elements of Physical Hydrology")

そもそも雨ってどんな機器で測るのか?







転倒マス雨量計


14


降水時間変動





(Hornberger et al, 1998. "Elements of Physical Hydrology")
















CO2 による 放射スペクトル(W/m²/μm) 288 K 黒体 大気 20 **波長(μm)** 水蒸気による 水蒸気による 黒体と大気から射出される熱放射スペクトル

22





25

幸運なことに
$$PAR = 0.5R_S$$
 $NIR = 0.5R_S$ (W/m²)


光子エネルギーと波長の関係(Plankの式) $e=rac{hc}{\lambda}$

例えば、550 nmでは、 $e=3.6 \times 10^{-19}$ J



1 μmolの光子(6.02×10¹⁷個)の持つエネルギーは、

0.217 J/ μ mol



26

 $(\mu mol/m^2s)$

$$PPFD = 0.5 \times \frac{1}{0.217} \times R_{S}$$

$$= 2.3 R_{S}$$

$$= 2.3 R_{S}$$

$$= 2.3 R_{S}$$

