

1



流域試験地：流出観測点


2




3



4



5




6

乾燥土壤と湿润土壤の洪水緩和機能

森林総合研究所の理水試験地における長期観測から
洪水緩和機能を実証した研究 Tani 1997 Journal of Hydrology他多数



谷誠 京都大学名誉教授
令和3年度 日本農学賞受賞



谷によって洪水ピークが違う
⇒鉛直浸透における土層厚の影響 (Tani 2008他)
⇒長期にわたる森林放棄と植生変化の影響 (谷・細田、2012, Tani et al 2012他)

降り始めは、雨量に比べて流量が非常に小さく、蒸発散で乾燥した土壤に雨水が吸収
(森林は蒸発散量が多いので、この効果は大きい) =乾燥土壤の洪水緩和機能 (Tani 1997他)

後半は、雨量と流量がほぼ同じ規模で、時間変動が降雨よりもなだらかにならされている
=湿润土壤の洪水緩和機能 (Tani 1997, Tani et al 2008, Tani et al 2020他)

7

降雨


裸地: 降雨に対し即座に応答。
ピークが高い。
基底流量が小さい。

田 様


時 間

降雨に対する流域流出応答のイメージ


8




9



10




11



12

森林水文学の意義 (谷誠 京都大学名誉教授の資料より)



13